

HEPAPLANTES MAX



Tilskudsfoder til kvæg, får og geder

INDHOLD

Økologisk hvede, calciumcarbonat, lithothamnium, natriumchlorid, planter (Trigonella foenumgraecum, Allium sativum, Azadirachta indica, Trachyspermum ammi, Boldo, økologisk gurkemeje, Achyranthes aspera, Andrographis paniculata, økologisk tidsel, økologisk rosmarin, økologisk jordrøg, økologisk artiskok, økologisk rapsolie, økologisk sorte ræddiker, økologisk gyldenris).

ANALYTISKE BESTANDDELE

| | |
|--------------|-------|
| Råprotein | 6% |
| Rå fedt | 2,2% |
| Rå cellulose | 5,8% |
| Rå aske | 38,6% |
| Natrium | 2% |

ANDRE OPLYSNINGER

Dette tilskudsfoder indeholder 15% af et sensorisk tilsætningsstof (blanding af hydroalkoholiske ekstrakter af planter og tørrede planter)

De bioækvivalenser, der leveres af specifikke planter, er 50.000 mg/kg methionin og 120.000 mg/kg cholinchlorid.

Skal opbevares væk fra lys, fugt og overdreven varme

UB

Kan anvendes i økologiske landbrug i overensstemmelse med EU-Forordning nr. 834/2007 og nr. 889/2008. Certificeret af FR BIO 10.

58,9% mineraler, 41,1% af råstoffer fra landbrugsoprindelse, 40,5% af landbrugsingredienser der stammer fra økologisk landbrug eller landbrug under konvertering.

Dette tilskudsfoder må kun anvendes til de anførte arter.

EMBALLAGE

Indhold

20 kg spand



499 Rue des Valois
PA des Marches de Bretagne
ST HILAIRE DE LOULAY
85600 MONTAIGU-VENDEE FRANCE

www.difagri.com
Produced by: α FR 85 224 002



KS Specialfoder ApS

Vesterled 49 · 6650 Brørup
Tlf. 7538 2510 · info@ks-specialfoder.dk
www.ks-specialfoder.dk

BØR ANVENDES INDENFOR

18 måneder

TILSÆTNINGSSTOFFER

Aromastoffer

Blanding af aromatiske stoffer

BRUGERVEJLEDNING

Malkekøer

150 til 200 g/dag i 5 dage ved foderændring, goldperiode, første måned af laktation og varmemstress.

3 behandlinger i efterår-vinter med den første i oktober (5 dage), den anden i december (5 dage), den tredje i februar (5 dage).

Får og Geder

30 til 40 g/dag i 5 dage ved foderændring og varmemstress.

3 behandlinger fordelt på 2 måneder med den første, måneden efter faring.

Græsningskvæg

35 g pr. 100 kg kropsvægt i 5 dage ved foderændring og varmemstress.

Første kur ved 400-450 kg levende vægt med 150 g/dag i 5 dage. Anden kur ved 550-600 kg levende vægt 210 g/dag i 5 dage.

HEPAPLANTES MAX



Indeholder et mix af hydroalkoholiske ekstrakter af planter og tørrede planter



ARTISKOK

CHOLERETISK VIRKNING

Øger udskillelsen af galde og udskillelse af lipider



BOLDO

ANTIOXIDERENDE VIRKNING, CHOLERETISK OG VANDDRIVENDE



ROSMARIN

AFGIFTNING

Øger glutathion-S-transferase



TIDSEL

LIPOTROPISK VIRKNING OG CELLULÆR BESKYTTELSE AF HEPATOCYTTTER

